

## **DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR LOS MÉDICOS DE FAMILIA DE UN ÁREA DE SALUD, EN EL PERIODO 2003 - 2008**

Manrique Medina, Ruth Liliana; Muñoz Ureña, Alfonso; Fontcuberta Martínez, Julio; Pérez Aguilar, Francisco; Barragán Pérez, Alberto; Martínez García, Juan Francisco.

### **INTRODUCCION:**

Durante los últimos años se ha incrementado, en las agendas periodísticas y políticas, que la violencia sufrida por las mujeres por parte del compañero íntimo, es un grave problema y han puesto de manifiesto que se trata de un problema social y de salud pública de gran importancia. La captación de estos casos, por parte de los profesionales sanitarios del primer nivel de atención, es básica por ser el lugar donde acuden la mayoría de estas mujeres por distintos problemas de salud. Una percepción por los profesionales que asisten a estas mujeres es que el lugar de procedencia de estas se relaciona con el mayor riesgo de sufrir violencia de género.

### **OBJETIVO:**

1. Describir las características de la pacientes que han sido registradas en OMI AP con diagnóstico de violencia/maltrato o afines.
2. Conocer la relación existente entre el lugar de origen y la incidencia de violencia de género.

### **MATERIAL Y METODO:**

Diseño: Estudio descriptivo. Periodo de estudio años: 2003 a 2008. Fuente de datos: programa OMI AP GAP Cartagena. Sujetos: mujeres con tarjeta sanitaria individual (TSI) que durante los últimos cinco años han sido codificadas en OMI AP con los códigos CIAP-2: Z12, Z13 y Z25. Se analizaron las siguientes variables: edad, lugar de origen, diagnóstico, Nº registros OMI AP con códigos: CIAP z12, z13 y z25.

Se realizo un análisis descriptivo de frecuencias y medidas de tendencia central, Riesgo Relativo (IC95%).

### **RESULTADOS Y DISCUSIÓN:**

En Nº registros con los códigos CIAP-2: Z12, Z13 y Z25, en el periodo de estudio, fueron de 678 de los cuales 259 (38%) estaban relacionados con la violencia de género.

Se encontraron 39 descripciones diferentes para la violencia de género, 5 para describir violaciones por la pareja y 34 para los malos tratos (físicos, psíquicos etc.).

La edad media de las mujeres era de 40,13 años (4,5 a 89,9), el 4,6% tenían menos de 18 años.

Según el lugar de origen las mujeres latinoamericanas presentan una mayor incidencia (5,38 ‰) frente a las mujeres españolas (0,87 ‰), RR=6,18 (5,1-7,49).

### **CONCLUSIONES:**

1. La mayoría de las mujeres presentan una edad adulta joven, sin embargo una proporción importante es menor de edad.
2. La población inmigrante tiene mayor riesgo de sufrir violencia de género.
3. Las mujeres latinoamericanas son las que presentan una mayor incidencia.
4. No existe un código específico y único para registrar el diagnóstico de Violencia de Género, en el CIAP – 2