

Infección Gonocócica

Hoja informativa

¿Qué es la gonorrea o infección gonocócica?

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria llamada *Neisseria Gonorrhoeae* (o gonococo).


¿Como se puede contraer infección gonocócica?

Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sexuales **sin preservativo** con una persona que tiene la infección, a través de sexo anal, vaginal o por el sexo oral.

La infección es más común en los jóvenes, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), y las personas con múltiples parejas sexuales que no utilizan las medidas adecuadas de prevención.

Aunque usted haya tenido infección gonocócica en el pasado, y se haya tratado correctamente, es posible volver a contraer la infección, ya que no genera protección para toda la vida.

Bacteria *Neisseria gonorrhoeae*



¿Cuáles son los síntomas de infección gonocócica?

Más del 50% de las mujeres y del 10% de los hombres que tienen gonorrea no presentan síntomas. La infección en el recto y la garganta usualmente no produce ningún síntoma.

Cuando los síntomas están presentes los más comunes son:

En las mujeres;

- Un cambio en el color u olor o cantidad del flujo vaginal.
- Sangrado entre reglas o reglas más cuantiosas.
- Sensación de ardor al orinar
- Puede haber dolor o malestar en la parte inferior del abdomen.

En los hombres;

- Sensación de ardor al orinar.
- Secreción del extremo del pene
- Puede haber dolor en los testículos.



PUNTOS CLAVE:

La gonorrea es una infección de transmisión sexual.

Se transmite fácilmente de una persona a otra durante las relaciones sexuales no protegidas, incluyendo el sexo oral.

Con frecuencia no causa síntomas.

Si la gonorrea no se trata correctamente, puede originar problemas de salud a largo plazo.

Se puede prevenir usando SIEMPRE PRESERVATIVO* al mantener relaciones sexuales.

¿Cómo se diagnostica?

Se necesita una muestra de la zona genital, faríngea o anal para hacer el diagnóstico, dependiendo de las prácticas sexuales.

En ocasiones puede solicitarse además, una muestra orina.

Si cree posible haber estado en contacto con alguien con infección gonocócica, o si tiene síntomas que pudieran ser de infección gonocócica, debe acudir a su médico.



Plan Nacional sobre el Sida

*Barrera de látex: cuadrante de látex si practica sexo oral, preservativo de látex si practica sexo vaginal y/o anal.

Infección Gonocócica

Si usted tiene infección gonocócica también deberá realizarse pruebas para detectar otras Infecciones de transmisión sexual como sífilis, clamidia y VIH ya que puede tener más de una infección al mismo tiempo.

Es importante recibir el tratamiento específico tan pronto como sea posible, ya que si no se trata puede causar complicaciones y graves problemas de salud a largo plazo.

¿Cómo se previene?

Utilizando **siempre** preservativo* durante las relaciones sexuales. Si se comparten juguetes sexuales para la penetración, es importante un preservativo para cada persona.

¿Se pueden mantener relaciones sexuales?

Se debe **evitar** tener relaciones sexuales, aun utilizando preservativo*, hasta que, tanto la persona afectada como su pareja sexual hayan finalizado el tratamiento y los síntomas hayan desaparecido.

¿Cuáles son las posibles complicaciones de la infección gonocócica?

Si se trata correctamente es poco probable que la gonorrea ocasione problemas de salud a largo plazo. Sin embargo, sin tratamiento, la infección puede extenderse a otras regiones del organismo.

Las mujeres pueden desarrollar enfermedad inflamatoria pélvica, la cual puede provocar dolor en abdomen y pelvis.

También puede conducir a infertilidad y embarazo ectópico (embarazo que se produce fuera del útero).

Los hombres pueden desarrollar una infección dolorosa en los testículos.

En algunos casos, cuando la gonorrea no se ha tratado, puede producir infecciones en otras regiones del organismo, como la piel y las articulaciones.

Infección gonocócica y embarazo

Una mujer embarazada con infección gonocócica no tratada, puede transmitir la infección a su hijo/a durante el parto.

Esto puede causar infección ocular grave en el recién nacido.

¿Debo decírselo a mi pareja?

Si usted tiene infección gonocócica, es esencial que su pareja sexual actual y las parejas anteriores consulten a su médico.

De esta forma usted evita contraer nuevamente la infección y además su pareja podrá tratarse en caso de necesitarlo y no desarrollará complicaciones.

Ayuda e información

Si usted sospecha que pueda tener gonorrea u otra infección de transmisión sexual consulte a su médico.

¿Dónde puedo obtener más información?

<http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/homeITS/htm>

www.facebook.com/informacionVIH

www.cruzroja.es/vih

informacionvih@cruzroja.es

Twitter: @infoVIHCruzRoja

App: VIH y SIDA Cruz Roja



Plan Nacional sobre el Sida