

# Calendario acelerado de vacunación

xullo 2019





A información relativa a esta campaña pódese consultar na web da Dirección Xeral de Saúde Pública:

[www.sergas.gal/Saude-publica/Programa Galego de Vacinación \(PGV\)](http://www.sergas.gal/Saude-publica/Programa%20Galego%20de%20Vacina%20(PGV))

**ASUNTO:**

Calendario acelerado de vacinación

**DATA DO CAMBIO:**

Xullo 2019

**ORIXE:**

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

**DESTINATARIOS:**

Centros de saúde / hospitais públicos / hospitais e centros médicos privados / outros tipos de centros / xefaturas territoriais da Consellería de Sanidade / EOXI

**Edita:**

Consellería de Sanidade

Dirección Xeral de Saúde Pública

# ÍNDICE

Acrónimos utilizados .....	4
Introducción .....	5
Táboa 1: Vacinação acelerada. Idade mínima, número de doses e intervalo de tempo entre doses .....	6
Táboa 2: Calendario acelerado para menores de 7 anos de idade .....	7
Táboa 3: Calendario acelerado para persoas de entre 7-18 anos .....	8
Táboa 4: Calendario acelerado para persoas maiores de 18 anos .....	9

## Acrónimos utilizados

DTPa	Vacina fronte a difteria, tétano e tose ferina acelular
HA	Vacina fronte á hepatite A
HB	Vacina fronte á hepatite B
Hib	Vacina conxugada fronte a <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
MenACWY	Vacina conxugada fronte a meningococo de serogrupos A, C, W e Y
MenC	Vacina conxugada fronte a meningococo de serogrupo C
Td	Vacina fronte a tétano e difteria
TV	Vacina tripla vírica (fronte a sarampelo, rubéola e parotidite)
VNC	Vacina fronte a pneumococo conxugada
VPH	Vacina fronte a virus do papiloma humano
VPI	Vacina fronte a poliovirus inactivada
VVZ	Vacina fronte á varicela

# Introdución

Este documento resume as últimas recomendacións de calendarios acelerados de vacinación, baseándose no recollido no *Calendario acelerado de vacinacións* elaborado pola Área de Programas de Vacinación do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, aprobado o 3 de xuño de 2019.

Os *calendarios acelerados* consisten en administrar vacinas con intervalos de tempo entre doses sucesivas acurtados, en persoas con historia de vacinación incompleta ou inexistente, ou que recibisen doses de vacinas con pautas incorrectas. Estas estratexias de vacinación teñen especial interese no caso de poboación procedente doutros países, onde rexen programas de vacinación diferentes ao noso, e é preciso adaptala o antes posible ao calendario de vacinación da poboación autóctona.

O obxectivo deste documento é servir de instrumento de apoio a profesionais sanitarios con actividades no campo da vacinación que precisen deseñar pautas de vacinación acelerada. Pódese consultar o documento base en [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Calendario\\_Acelerado\\_Vacunaciones.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Calendario_Acelerado_Vacunaciones.pdf)

Débese ter en conta as recomendacións do Programa Galego de Vacinación, en canto ás vacinas financiadas por este.

A continuación preséntanse as pautas xerais de vacinación por tipo de vacinas (táboa 1) e o calendario acelerado en menores de 7 anos (táboa 2), entre 7 e 18 anos (táboa 3) e en adultos (táboa 4), aínda que as recomendacións de vacinación serán individualizadas en función da idade e as vacinas pendentes de administración.

**Táboa 1: Vacinación acelerada. Idade mínima, número de doses e intervalo de tempo entre doses\***

Vacina	Idade mínima 1. <sup>a</sup> dose	N.º doses requiridas	Intervalo 1. <sup>a</sup> e 2. <sup>a</sup> dose	Intervalo 2. <sup>a</sup> e 3. <sup>a</sup> dose	Intervalo 3. <sup>a</sup> e 4. <sup>a</sup> dose
HB	0 m	3	4 s	5 m	
MenC	8 s	Segundo a idade <sup>1</sup>	8 s-6 m	6 m	
TV	12 m	2	4 s		
VVZ	12 m	2	4 s		
DTPa	8 s	Segundo a idade <sup>2</sup>	4 s	6 m	6 m
Td	7 a	3+2	4 s	6 m	
VPI	8 s	Segundo a idade <sup>2</sup>	4 s	6 m	6 m
Hib	8 s	Segundo a idade <sup>2</sup>	4 s	6 m	
VNC	8 s	Segundo a idade <sup>3</sup>			
VPH (mulleres)	12 a	Segundo a idade <sup>4</sup>			

s: semanas; m: meses; a: anos

\* A idade mínima estableceuse en función das recomendacións acordadas polo CISNS. Consultar tamén as táboas 2, 3 e 4.

- MenC:** Entre os 2 e os 12 meses a primovacinação pode ser de 1 ou 2 doses (separadas entre 8 semanas e 6 meses) segundo a vacina utilizada e a idade; aconséllase unha dose de recordo despois dos 12 meses de idade e outra aos 12 anos (con MenACWY). En maiores de 12 meses é suficiente con 1 dose como primovacinação.
- O número de doses depende do momento de inicio da vacinación: durante o primeiro ano de vida recoméndanse 2 doses de primovacinação e unha dose de recordo (por exemplo 2, 4 e 11 meses). Ver táboas 2, 3 e 4 para o número de doses que cómpre administrar segundo o grupo de idade.
- VNC:** Nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2010. En menores de 12 meses, segundo o calendario (2, 4 e 11 meses) ou polo menos 4 semanas entre as dúas primeiras doses e polo menos 8 semanas coa terceira dose. Entre os 12 e os 23 meses, 2 doses separadas polo menos 8 semanas. A partir dos 2 anos de idade, só 1 dose.
- VPH:** Administración de dúas doses en mulleres adolescentes a partir dos 12 anos de idade (pauta 0-6 meses). ≥15 anos 3 doses (pauta 0, 1-2, 6 meses).

Táboa 2: Calendario acelerado para menores de 7 anos de idade\*

Vacina	0 (1.ª visita)	Meses contados desde a primeira visita			Dose recordo
		1 mes	2 meses	8 meses	
DTPa <sup>1</sup>	DTPa		DTPa	DTPa	DTPa/dTpa
VPI <sup>2</sup>	VPI		VPI	VPI	
Hib <sup>3</sup>	Hib		Hib	Hib	
HB <sup>4</sup>	HB		HB	HB	
TV <sup>5</sup>	TV	TV			
MenC <sup>6</sup>	MenC				MenC
VNC <sup>7</sup>	VNC13		VNC13		
VVZ <sup>8</sup>	VVZ	VVZ			

\* A actualización da vacinación realizarase tendo en conta o calendario oficial vixente ata a idade do/da menor. Poderase utilizar vacina hexavalente en caso de necesitar administrar todos os antíxenos (DTPa, VPI, Hib e HB). A separación entre a primeira e a segunda dose será de 1 ou 2 meses segundo o preparado comercial utilizado.

[https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/VacunasHexavalentes\\_menores7anos.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/VacunasHexavalentes_menores7anos.pdf)

- DTPa:** Pauta 2+1 (0, 2) e dose de recordo polo menos 6 meses despois da última primovacinação, preferiblemente aos 11 meses. Dose de recordo aos 6 anos.
- VPI:** Se a terceira dose se administra despois dos 4 anos, non é necesaria unha cuarta dose.
- Hib:** O número de doses depende do momento de inicio da vacinación: durante o primeiro ano de vida recoméndanse 2 doses de primovacinação e unha dose de recordo (por exemplo 2, 4 e 11 meses de vida). Entre 1 e 5 anos é suficiente cunha dose e non se recomenda esta vacinación a partir dos 5 anos.
- HB:** Pauta 0, 2, 6 meses (8 meses desde a primeira visita) ao utilizar vacina hexavalente. Pauta 0, 1, 6 meses se se utiliza vacina monovalente.
- TV:** 2 doses (a partir dos 12 meses) separadas 4 semanas ou axustadas ao calendario de vacinacións segundo a idade.
- MenC:** Entre os 2 e os 12 meses as recomendacións varían segundo a vacina utilizada e a idade. En menores de 12 meses a primovacinação pode ser 1 ou 2 doses (separadas 8 semanas); aconséllase unha dose de recordo a partir dos 12 meses de idade. En maiores de 12 meses é suficiente con 1 dose.
- VNC:** Nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2010. En menores de 12 meses, segundo o calendario (2, 4 e 11 meses) ou polo menos 4 semanas entre as dúas primeiras doses e a terceira polo menos 8 semanas coa segunda dose. Entre os 12 e os 23 meses, 2 doses separadas polo menos 8 semanas. En maiores de 2 anos de idade, só 1 dose.
- VVZ:** Maiores de 12 meses. Unicamente en caso de non ter antecedentes de padecemento de varicela ou herpes zóster ou que sexan incertos, e non estar vacinado con anterioridade. Dúas doses separadas polo menos 4 semanas (e preferiblemente 8 semanas) ou axustadas ao calendario de vacinación oficial segundo a idade. No caso de recibir unha dose previamente, recibirán unha segunda dose.

Táboa 3: Calendario acelerado para persoas de entre 7-18 anos

Vacina	0 (1.ª visita)	Meses contados desde a primeira visita		
		1 mes	6 meses	8 meses
Td <sup>1</sup>	Td	Td		Td <sup>1</sup>
VPI <sup>2</sup>	VPI	VPI		VPI
HB	HB	HB	HB	
TV <sup>3</sup>	TV	TV		
MenC/MenACWY <sup>4</sup>	MenC/MenACWY			
VVZ <sup>5</sup>	VVZ	VVZ		
VPH <sup>6</sup>	VPH		VPH	

- Td**: A terceira dose débese administrar entre 6 e 12 meses tras a segunda dose. Dose de recordo ata completar 5 doses: tras a primovacinação con tres doses, recordos cada 10 anos (mínimo 1 ano tras a terceira dose de primovacinação e entre as doses de recordo). En nenos e adolescentes administrárase polo menos 1 das doses con dTpa.
- VPI**: Primovacinação con 3 doses para persoas non vacinadas procedentes de países con circulación de virus salvaxe (<http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/>). Para países en que circularon virus derivados da vacina e países con risco de reintrodución, 1 dose.
- TV**: 2 doses separadas polo menos 4 semanas en persoas sen documentación de vacinación previa e que non pasaron a enfermidade. En caso de ter recibido unha dose con anterioridade, administrárase unha soa dose, independentemente do tempo que tivese pasado desde a administración previa. Poderase utilizar vacina tetravírica en caso de necesitar administrar tamén VVZ.
- MenC/MenACWY**: Se ten entre 7-12 anos, administrárase MenC e aos 12 anos recibirá ademais unha dose de recordo con MenACWY (ver táboa 1 para intervalos). Se ten máis de 12 anos, administrárase unha dose de MenACWY.
- VVZ**: 2 doses separadas polo menos 4 semanas (e preferiblemente 8 semanas) se non existe evidencia de ter pasado a enfermidade. Poderase utilizar vacina tetravírica en caso de necesitar administrar tamén TV.
- VPH**: Administración de dúas doses en mulleres adolescentes a partir dos 12 anos de idade e non vacinadas (pauta 0-6 meses). Se >= 15 anos, 3 doses (pauta 0, 1-2, 6 meses).



Táboa 4: Calendario acelerado para persoas maiores de 18 anos.

Vacina	0 (1.ª visita)	Meses contados a partir da primeira visita		
		1 mes	6 meses	8 meses
<b>TV<sup>1</sup></b>	TV	TV		
<b>Td<sup>2</sup></b>	Td	Td		Td <sup>2</sup>
<b>VPI<sup>3</sup></b>	VPI	VPI		VPI
<b>HB<sup>4</sup></b>	HB	HB	HB	
<b>VVZ<sup>5</sup></b>	VVZ	VVZ		
<b>VPH<sup>6</sup></b>	VPH	VPH	VPH	

- TV:** Recoméndase a vacinación en persoas nadas en Galicia a partir de 1968 sen historia de vacinación documentada e en persoas non nadas en España e sen documentación de vacinación previa. Administraranse dúas doses de TV cun intervalo de polo menos catro semanas entre doses. En caso de terse administrado unha dose con anterioridade, administrárase unha soa dose, independentemente do tempo que pasase desde a administración previa.
- Td:** A terceira dose débese administrar entre 6-12 meses da segunda dose. Dose de recordo ata 5 doses en total ao longo de toda a vida. Tras a primovacinação (3 doses), dúas doses de recordo separadas 10 anos (mínimo 1 ano tras a primovacinação e entre doses de recordo).
- VPI:** Primovacinação con 3 doses para persoas adultas non vacinadas procedentes de países con circulación de virus salvaxe (<http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/>). Para países en que circularon virus derivados da vacina e países con risco de reintrodución, 1 dose.
- HB:** Recoméndase a realización de marcadores serolóxicos (AgHBs, anti-HBs e anti-HBc) en persoas de grupos de risco e en inmigrantes sen historia documentada de HB que procedan de países de alta endemia. En caso de resultado negativo, recoméndase a vacinación con 3 doses de HB nas persoas con risco de infección por VHB.
- VVZ:** Realízase seroloxía de varicela (IgG) se non presenta antecedentes de enfermidade nin se vacinou con dúas doses. En caso de antecedente de 1 dose, administrárase a segunda dose.
- VPH:** Administración de tres doses en mulleres nadas a partir do 1 de xaneiro de 1994 (pauta 0, 1-2, 6 meses).

 Xacobeo 2021

galicia

Consellería  
de Sanidade

Saúde Pública