

ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS NO MANEXO DE CONTACTOS ESTREITOS DA COVID-19

Tipo de contacto estreito		Medidas específicas	Realización PDIA de seguimento
NON relación con ámbitos vulnerables	Poboación xeral	NON	NON
	Grupo vulnerable		
Relación con ámbitos ou grupos vulnerables	Traballa en contacto directo ou prestando coidados	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Centros sanitarios e sociosanitarios</u>: uso continuado de FFP2. - <u>Centros sanitarios asistenciais</u>: readaptación de posto si traballa en unidades de alto risco, está inmunodeprimido ou NON está vacinado. 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>PDIA inicial</u>: día 0-3 despois do último contacto. - <u>PDIA final (recomendase PCR)</u>: día 5-7 despois do último contacto.
	Usuario frecuente (>1 vez/semana)	<p><u>NON garanten uso adecuado da máscara:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ata resultado PDIA final: suspender actividades evitando contacto con outros usuarios ou realizar actividades individualmente con uso de máscara por parte do persoal do ámbito. - Unidades de alto risco en centros sanitarios asistenciais: atención en sala individual ata resultado PDIA final. 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>PDIA final (recomendase PCR)</u>: día 5-7 despois do último contacto.
	Institucionalizado ou residente sociosanitario	<p><u>NON garanten uso adecuado da máscara:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Manter distancia de seguridade co resto de persoas institucionalizadas - Reducir actividades con outras persoas institucionalizadas que non facer uso adecuado da máscara <p><u>Varios contactos estreitos na institución</u>: sectorializar o centro e separar aos contactos estreitos do resto de persoas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>PDIA final (recomendase PCR)</u>: día 5-7 despois do último contacto. <p>NON recomendada para os contactos institucionalizados que foran caso confirmado nos últimos 3 meses.</p>
Hospitalizado	<p><u>Corentena en habitación individual</u> ata pasados 7 días do último contacto e co resultado da PDIA final. En caso de inmunosupresión valorar aumentar corentena ata pasados 10 días do último contacto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>PDIA inicial</u>: día 0-3 despois do último contacto. - <u>PDIA final (recomendase PCR)</u>: día 5-7 despois do último contacto. 	
<p>Todos os contactos estreitos, relacionados ou non con ámbitos vulnerables, deben seguir as " Recomendacións preventivas para contactos estreitos da COVID-19 " durante os 10 días seguintes ao último contacto co caso da COVID-19.</p>			