TOS FERINA

La tosferina es una infección aguda de las vías respiratorias causada por la bacteria *Bordetella pertussis*, patógeno exclusivamente humano que se transmite por un contacto estrecho con la persona infectada.

Los casos con tosferina, confirmada o sospechosa, deben tratarse con antibiótico lo más pronto posible, y los niños deben ser excluídos de centros escolares y guarderías durante 5 días a contar desde el comienzo del tratamiento. Lo mismo hay que hacer con los casos que trabajan en estos centros.

Además, y una vez que se recuperen de su enfermedad aguda, los casos no vacunados previamente o los casos hasta los 7 años de edad parcialmente inmunizados, deben completar la vacunación primaria y la dosis de recuerdo según calendario vacunal.

El manejo de los contactos de los casos de tosferina se puede consultar en el enlace de abajo.

Algoritmo de actuación cos casos sospeitosos ou confirmados de tose ferina

Volumen 4 - Nº 23: El manejo de los contactos de los casos de tosferina

Vacunación en la embarazada

Información sobre la vacunación frente a la tosferina en las mujeres embarazadas.

VACUNACIÓN FRENTE A LA TOS FERINA

PROGRAMA GALLEGO DE VACUNACIÓN (PGV)

LIGAZÓNS ASOCIADAS

INFORMACIÓN EN VENRES EPIDEMIOLÓXICO

INFORMACIÓN DE GALICIA

A tose ferina en Galicia de 1983 a 2023

Última actualización